

BLSD paziente adulto – CTE già iniziate dagli astanti

NOMINATIVO: _____ **Assoc.** _____ **Data:** _____

Istruzioni ai soccorritori:

.....

LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE (in neretto le indicazioni per l'allievo)		✓
1. Valuta la scena	Scena sicura	
2. Il primo soccorritore si affianca all'astante che esegue le CTE e lo sostituisce, continuando le compressioni; Chiede DAE;	Individua il punto corretto di compressione e prosegue le CTE	
3. Durante le CTE valuta le reazioni della vittima (senza interrompere le compressioni); Fa allertare la SOREU	Nessuna reazione, NON respira (o respiro ANORMALE COMPATIBILE con ACC); Comunica ACC alla SOREU. Continua CTE fino a DAE pronto (conta ad alta voce)	
4. Il 2° soccorritore prepara il DAE e il torace	Scopre il torace quanto basta, rade e asciuga se necessario	
5. Accende il DAE e Applica gli elettrodi (non interrompendo CTE)	Accende il DAE applica gli elettrodi e consente l'analisi	
6. Allontana i presenti, garantisce sicurezza per tutti durante l'analisi del DAE e l'erogazione dello shock	Allontana i presenti e l'O₂, pronuncia la filastrocca durante l'analisi	
7. Eroga shock se consigliato	Eroga la scarica	
8. Riprende (o fa riprendere) immediatamente CTE	Esegue CTE (valutare tecnica ed efficacia)	
9. Il 1° soccorritore apre le vie aeree, ispeziona la cavità orale e posiziona la cannula orofaringea (opzionale)	Estende il capo, solleva il mento, rimuove eventuali corpi estranei evidenti	
10. Effettua 2 lente ventilazioni con pallone autoespansibile + reservoir collegati ad O ₂ ad alti flussi	Valutare correttezza della manovra (1 secondo per ognuna) ed efficacia (espansione del torace)	
11. Prosegue con RCP 30:2 efficace con O ₂ , fino alla successiva analisi del DAE	Ad ogni analisi interrompe RCP esegue il cambio per le CTE	
12. Riconosce e risolve i messaggi di allarme/malfunzione del DAE	Allerta la SOREU, continua con RCP e rimuove la causa se possibile	

PUNTI DI FORZA: _____

ASPETTI MIGLIORABILI: _____

INDICAZIONI/SUGGERIMENTI: _____
