



1 SECONDO QUANTO APPRESO E' CORRETTO PARLARE DI URGENZA IN PRESENZA DI PARTO FISIOLÓGICO?

- a. Si **X**
- b. No
- c. Solo se in presenza di emorragie
- d. Solo in caso di Ipertensione

2 L'URGENZA GINECOLOGICA PIU' FREQUENTE E':

- a. Rottura di parete dell'ovaio
- b. Metrorraggia **X**
- c. Amenorrea
- d. Dismenorrea

3 LE FASI DEL PARTO IN ORDINE SONO:

- a. Dilatante, espulsivo, secondamento **X**
- b. Secondamento, espulsivo, dilatante
- c. Dilatante, secondamento, espulsivo
- d. Espulsivo, secondamento, dilatante

4 SECONDO QUANTO APPRESO IN QUALI CASI BISOGNA ASSISTERE IL PARTO IN POSTO ?

- a. In presenza di contrazioni irregolari e distanza notevole dal presidio ospedaliero
- b. Ogni volta che presupponiamo un pericolo per la partorientente
- c. In presenza di bisogno irrefrenabile di spingere, emorragia e distensione del perineo **X**
- d. In nessuno di questi casi

5 SI DEFINISCE PARTO PRE-TERMINE SE SI PRESENTA PRIMA DELLA:

- a. 37 Settimana **X**
- b. 40 Settimana
- c. 28 Settimana
- d. In ogni caso se si verifica prima del giorno presunto

6 SE CI TROVIAMO AD ASSISTERE UN PARTO SUL POSTO E' INDISPENSABILE:

- a. Rimanere tranquilli e far respirare la partorientente in maniera regolare
- b. Disinfettare le proprie mani e utilizzare guanti sterili **X**
- c. Disinfettare il perineo della partorientente
- d. Avere a disposizione molta acqua calda

7 DURANTE LA FASE ESPULSIVA E' INDISPENSABILE:

- a. Sostenere il bambino ed evitare le trazioni sul bambino
- b. Mantenere il bambino sul torace della mamma e asciugarlo
- c. Registrare l'ora della nascita
- d. Tutte le precedenti affermazioni sono corrette **X**

8 SECONDO QUANTO APPRESO COSA E' INDISPENSABILE VALUTARE NEL NEONATO ?

- a. Pianto valido e tono muscolare **X**
- b. Lucidità del cordone ombelicale
- c. Presenza di riflessi corneali
- d. Dimensioni del cranio

10 SE DURANTE LA VALUTAZIONE DEL NEONATO SONO PRESENTI SEGNI DI PERICOLO:

- a. Informare immediatamente la COEU/SOREU e avviare la Rianimazione Neonatale **X**
- b. Tentare la rianimazione Neonatale e se non efficace informare la COEU/SOREU
- c. Disporre per un rapido Rendez-Vous e/o trasporto in PS
- d. Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta

11 DURANTE LA RIANIMAZIONE NEONATALE IL RAPPORTO COMPRESSIONI/VENTILAZIONI E':

- a. 15/2
- b. 30/2
- c. 3/1 **X**
- d. 5/2

12 LA PRIMA MANOVRA DA EFFETTUARE SUL NEONATO E':

- a. Frizionare delicatamente la bocca il torace e i piedi
- b. Schiaffeggiare il dorso del bambino
- c. Tagliare il cordone ombelicale
- d. Avvolgere il neonato in un panno caldo e umido **X**

13 DURANTE IL SECONDAMENTO LA PERDITA EMATICA PUO' ARRIVARE ANCHE FINO A:

- a. 2000 ml
- b. 500 ml **X**
- c. 1000 ml
- d. 1500 ml

14 SE LA PARTORIENTE PRESENTA UN ACC IL PUNTO DI REPERE E LA MODALITA' DI RCP:

- a. Restano immutati rispetto al protocollo BLSD adulto **X**
- b. Cambiano in base alla dimensione dell'addome materno
- c. Non si effettua RCP per evitare danni al bambino
- d. Cambiano in base alla settimana di gestazione